

MOUSTIMUG®

Ce produit offre jusqu'à 12 heures de protection contre les moustiques communs et tropicaux (*Aedes spp.*, *Anopheles spp.*, *Culex spp.*). Protège également contre les tiques (*Ixodes ricinus*) jusqu'à 8 heures et contre les moucherons piqueurs (*Culicoides spp.*) jusqu'à 8 heures 30.



Adultes & Enfants >12 ans
Max. 2x / jour



Enfants 6 - 12 ans
Max. 1x / jour



MODE D'EMPLOI

Pour le traitement du visage, pulvériser la solution répulsive dans la paume de la main, puis l'appliquer sur la peau du visage en veillant à protéger les yeux. **Ne pas pulvériser directement sur le visage.** Ne pas pulvériser dans les yeux ni appliquer autour des yeux. **Ne pas utiliser sur une peau lésée ou brûlée.** Lors d'une utilisation combinée avec une crème solaire, appliquer toujours le répulsif **après que la crème solaire a complètement séché.** Appliquer avec parcimonie afin de couvrir uniformément les parties découvertes du corps. Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : appliquer un total de 40 pulvérisations sur les parties du corps indiquées. Pour les enfants de 6 à 12 ans : appliquer un total de 17 pulvérisations sur les parties du corps indiquées.



Les 2
avant-bras



Les 2 jambes
inférieures



Les pieds



Les 2 mains



Le visage /
La tête



Le cou

POUR LES ADULTES ET ENFANTS > 12 ANS nombre de pulvérisations par partie du corps

7	13	7	5	7 (dont 3 à 4 pour le visage)	1 à 2
---	----	---	---	----------------------------------	-------

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS nombre de pulvérisations par partie du corps

3	7	3 à 4		3 (dont 1 à 2 pour le visage)	1 à 2
---	---	-------	---	----------------------------------	-------

SUBSTANCE ACTIVE: DEET 50%

COMPOSITION: N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET (50 %) 485 g/kg) CAS 134-62-3, alcool éthylique (37,77 %).

Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.

Lire attentivement l'étiquette et les instructions avant utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants et des animaux non ciblés/animaux domestiques. **Ne pas appliquer sur les enfants de moins de 6 ans.** Pour les enfants de moins de 12 ans, le répulsif doit être appliqué par un adulte. Ne pas utiliser sur les mains des enfants. Des facteurs tels que des températures élevées, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de protection de tous les répulsifs. Ne pas se baigner après l'application. Se laver soigneusement les mains avant de manipuler ou de consommer des aliments.

DANGER : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient de l'iso-eugénol, du linalol, de l'acétate de linalyle, du dl-citronellol. Peut provoquer une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et suivre toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation nationale. En cas de consultation médicale, garder à portée de main le récipient ou l'étiquette. EN CAS D'INHALATION : si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. Ne pas faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : en cas d'irritation, rincer à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée accidentelle : rincer à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer à l'eau. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas réutiliser l'emballage et ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe. Maintenir le récipient bien fermé et protéger du gel. Ne pas inhaler le produit. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité d'aliments, de fourrages, d'eau potable ou de boissons, ni sur des surfaces ou ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec ceux-ci, ni sur des animaux d'élevage/animaux domestiques. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Éviter le contact de la peau traitée avec les aliments. L'utilisation de vêtements couvrant les zones non traitées est recommandée afin de limiter l'accès aux insectes piqueurs.